

## PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

### Barilux-HD, 340g, suukaudse suspensiooni pulber Baariumsulfaat

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.**

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

#### **Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis ravim on Barilux-HD ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Barilux-HD kasutamist
3. Kuidas Barilux-HD kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
- 5 Kuidas Barilux-HD säilitada

### **1. MIS RAVIM ON BARILUX-HD JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks

Barilux-HD kasutatakse söögitoru, mao ja kaksteistsõrmiku topeltkontrastradioloogilisel uuringul. Toimeaine on baariumsulfaat, mis on vees praktiliselt lahustumatu ja ei oma farmakoloogilist mõju.

### **2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE BARILUX-HD KASUTAMIST**

#### **Ärge kasutage Barilux-HD'd:**

- kui te olete allergiline (ülitundlik) baariumsulfaadile või Barilux-HD mõne koostisosa suhtes.
- kui teil esineb mao või soolte perforatsioon (mulgustus)
- kui on kahtlus söögitoru ja seedetrakti värskele kahjustusele või söövitusele
- kui teil on nekrootiline enterokoliit
- vahetult enne või vahetult pärast söögitoru ja seedetrakti kirurgilist operatsiooni
- kui teil on ebaselge või ägeda kõhu ja peritoniidi tunnused
- kui on kahtlus perforatsioonile, postoperatiivsetele (operatsioonijärgsetele) kõhuvaevustele

#### **Barilux-HD oraalne manustamine on vastunäidustatud:**

- soolesulguse (iileus) korral
- soolesulguse eeljärgu (subiileus) korral
- avausetuse (atreesia) korral
- söögitoru, seedetrakti ja bronhiaalpuu (erineva läbimõõduga hingetorud) fistlite (uurised) korral

#### **Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Barilux-HD:**

- kui te põete bronhiaalastmat
- kui teil on esinenud atoopiat (allergia teatud tüüp) nt heinapalavikku või atoopilist ekseemi (spetsiifiline nahalööve)
- kui teil esineb neelamishäireid

#### **Võtmine koos teiste ravimitega:**

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

### **Rasedus ja imetamine**

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Barilux-XD ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

### **Oluline teave mõningate Barilux Suspension koostisainete suhtes**

Ravim sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

## **3. KUIDAS BARILUX-HD'D KASUTADA**

Kasutage Barilux-HD'd alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on tunne, et Barilux-HD toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Barilux-HD on suukaudseks manustamiseks.

Barilux-HD annus ja kontsentratsioon sõltub konkreetsest patsiendist ja uuritavast piirkonnast.

Tavaline täiskasvanu annus on 90...180 ml suspensiooni sisse juua.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

## **4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED**

Nagu kõik ravimid, võib ka Barilux-HD põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimetest on esinenud allergilisi reaktsioone, iiveldust ja harva kõhulahtisust või kõhukinnisust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

## **5. KUIDAS BARILUX-HD'D SÄILITADA**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage Barilux-XD'd pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. LISAINFO**

### **Mida Barilux-XD sisaldab**

Toimeaine on baariumsulfaat.

### **Müügiloo hoidja**

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

**Infoleht on kooskõlastatud mais 2010**